

Vejledning

Pakning af operationskasser/enheder til diverse øjenoperationer og relateret procedure mv

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
Instruktioner		Side: 1 af 1
Pakning af operationskasser/enheder til diverse øjenoperationer og relateret procedure mv		Dok. nr.: I-014
Målgruppe: Sygeplejerske		Version: 2
Udarb.: Kirsten+Ken	Godk. af: Ken	Dato: 05-10-2015

Struktur	Proces	Resultater
Klinikassistenter kan håndtere diverse instrumenter i forbindelse med at forberede instrumenter efter og før øjenoperationer	Opvask-pakke-autoklaverings-udpakke	Færdige komplette operationspakker og opdækninger

Operation	Indhold i pakken	Andet
Øjenlåsoperation: Blefarochalasis, øvre øjenlåg: 45 min afsættes	Kirurgisk pincet Saks spids Pean Kompress	Øjendråber oxybuprocain 1% Swap (sprit) 2 x Xylocain 2 % i 5 ml sprøjte Handske 8½ Knivblad 15 6-0 Ethilon Diatermi
Xantelasmata: 30 min afsættes Suturfjernelse efter 6 dage	Kirurgisk pincet Saks spids Pean Kompress	Øjendråber oxybuprocain 1% Swap (sprit) 2 x Xylocain 2 % i 5 ml sprøjte Handske 8½ Knivblad 15 6-0 Ethilon Diatermi
Entropion, indadrejet: 30 min afsættes til operation Ingen suturfjernelse	Kirurgisk pincet Saks spids Pean Chalazionklemme, den runde Kompress	Øjendråber oxybuprocain 1% Swap (sprit) 2 x Xylocain 2 % i 5 ml sprøjte Handske 8½ Knivblad 15 6-0 Vicryl
Ectropion, udadrejet: 30 min afsættes til operation Ingen suturfjernelse	Kirurgisk pincet Saks spids Pean Chalazionklemme, den runde Kompress	Øjendråber oxybuprocain 1% Swap (sprit) 2 x Xylocain 2 % i 5 ml sprøjte Handske 8½ Knivblad 15,

<p>Chalazion: 20 min afsættes til operation Forbinding Ingen suturfjernelse</p>	<p>Kirurgisk pincet Saks spids Curette Chalazionklemme, den runde Kompress</p>	<p>6-0 Vicryl Øjendråber oxybuprocain 1% Swap (sprit) 2 x Xylocain 2 % i 5 ml sprøjte Handske 8½ Knivblad 15</p>
<p>Knast: cyste, atherom, papillom lipom, uspecifik forandring: 20 min afsættes Evt suturfjernelse Evt Biopsi</p>	<p>Kirurgisk pincet Saks spids Pean</p>	<p>Øjendråber oxybuprocain 1% Swap (sprit) 2 x Xylocain 2 % i 5 ml sprøjte Handske 8½ Knivblad 15, Evt 6-0 Ethilon</p>
<p>Diverse operationer:</p>		
<p>Suturfjernelse: 5-10 minutter</p>	<p>Vannas saks Sutur pincet</p>	<p>Swap (sprit)</p>
<p>Fjernelse af copus alienum cornea: Ingen ekstra tid</p>	<p>Rosenbor</p>	<p>Øjendråber oxybuprocain 1% Engangskanyle 25G</p>
<p>Epilering af cilier: Ingen ekstra tid.</p>	<p>Epileringspincet</p>	
<p>Fjernelse af conjunkival cyste: Ingen ekstra tid</p>	<p>Vannas saks Bonn pincet</p>	<p>Øjendråber oxybuprocain 1%</p>
<p>Gennemskylning af tårveje: Del af undersøgelsen ingen ekstra tid</p>	<p>Tårvejskanyle, standard Pryl, lille</p>	<p>Øjendråber oxybuprocain 1% 2 ml sprøjte</p>
<p>Kataraktoperation: Ca 30 min Obs pulsoxymetri</p>	<p>Pincet, kolibri Saks spids Phaconål Strammer Phaco-hovedet Sleve Injektor Øjenspærre (blefarostat) Sideinstrument Tre vatpine</p>	<p>Øjendråber oxybuprocain 1% Swap (sprit) Opløsning Povidoneiodid Opløsning Klorhexidin 0.5% Inj.opl. Cefuroxim 1mg/ml Drop.opl. Atropin 0.6 mg/l Handske 8½ Intraoculærlinse fra AMO Procedurepakke fra AMO</p>