

## Instruks Anafylaksi beredskab, udstyr og medicin

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
Instruktioner		Side: 1 af 1
Anafylaksi beredskab, udstyr og medicin		Dok. nr.: I-016
Målgruppe: Alle		Version: 2
Udarb.: Kirsten+Ken	Godk. af: Ken	Dato: 05-10-2015

Struktur	Proces	Resultater
Klinikpersonale skal genkende symptomer på anafylaktisk reaktion	<p>Hudkløe, hududslet, hjertebanken, kløe i munden</p> <p>Vejrtrækningsbesvær</p> <p>Ved chock</p> <p>Selvekspanderende ventilationsposer med mundstykker i forskellig størrelse findes ved Hjertestarter i Køkkenet</p> <p>Sprøjter og kanyler findes i skabet på operationsstuen</p> <p>Adrenalin 1mg/ml findes i ampuller i køleskab i sterilisationsrum</p>	<p>Patienten placeres liggende med eleveret ben</p> <p>Epipen eller: Intramuskulært adrenalin 1mg/ml 0.3-0.5 ml</p> <p>0.5 – 0.8 ml adrenalin i.m herefter evt hvert 5. – 15. minut indtil anafylaksisymptomerne er forsvundet.</p>