

INSTRUKS

Administration af depomedrol eller andet steroidpræparat

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
Instruktioner		Side: 1 af 1
Administration af depomedrol eller andet steroidapparat		Dok. nr.: I-019
Målgruppe: Alle		Version: 2
Udarb.: Kirsten	Godk. af: Ken	Dato: 05-10-2015

Struktur	Proces	Resultater
<p>Klinikassistenten er sikker i korrekt administrering af injektioner</p>	<p>Hænder afsprites før og efter injektion.</p> <p>Personalet tjekker dato mærkning og ordinerende dosis</p> <p>Injektions stedet afsprittes. Kanyler holdes sterile.</p> <p>Der injiceres intramuskulært forudgået af aspiration. Administrationen journalføres</p>	<p>At der ikke overføres smitte til patienten og vice versa</p> <p>Sikre at der ikke anvendes for ældet medicin</p> <p>Sikre at der ikke overføres smitte til patienten</p> <p>Sikre at der ikke injiceres medicin intravasalt.</p>
<p>Personalet har viden om hvorledes medicinen skal injiceres og hvilke bivirkninger der kan være.</p> <p>Der må kun gives injektioner når speciallægen er tilstede i klinikken.</p>	<p>Patienten observeres i klinikken 20 minutter efter injektion</p> <p>Ved mistanke om allergiske reaktioner skal speciallægen tilkaldes</p> <p>Allergi registreres i cave modulet.</p>	<p>Undgå allergiske reaktioner</p> <p>Sikre korrekt behandling i tilfælde af allergiske reaktioner</p>