

Procedure
Cancer i øre-næse-halsområdet
Hurtig udredning ved mistanke om cancer

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen	
Instruktioner	Side: 1 af 1
Cancer i øre-næse-halsområdet	Dok. nr.: I-022
Målgruppe: Alle	Version: 2
Udarb.: Kirsten	Godk. af: Ken Dato: 05-10-2015

Struktur	Proces	Resultater
Konsultation senest en hverdag efter begrundet mistanke når: Nyopstået nasalstenose Blodigt sekret fra næsen Recidiverende blod fra næsen Sår der ikke heler (>2 uger) Synl. tumor i vest. nasi ell næse Ensidig hørenedsættelse Hæshed (>2uger) Synkebesvær + smert. til ørene Nyopdaget n. recurrensparase Evt vejrtrækningsbesvær Sår der ikke heler (>2 uger) Synl. el palp tum. i mund/svælg Nytilkommen tumor i spytkirtl. Vækst i kendt spytkirteltumor Begyndende n. facialisparese Tum i thyroidea+hæshed (recur) Hurt. vækst af thyroideaknude Hård immobil knude i thyroidea Forstørrede lymfeknu. på halsen Cyste lateralt på hals (>40år)	Hurtig udredning af cancer i Næse og eller bihule eller rhinopharynx Larynx- og hypopharynx Cavum oris og oopharynx Spytkirtlerne Glandula Thyroidea Metastase på halsen	Ørelægen henviser efter 48 timers reglen når denne har bekræftet mistanken om cancer

Palpation af halsen bilateralt indgår altid i udredningen