

## Undersøgelses af patienter med kronisk åbenvinklet glaukom (grøn stær)

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
Instruktioner	Side: 1 af 1	
Undersøgelse af patienter med kronisk åbenvinklet glaukom	Dok. nr.: I-026	
Målgruppe: Ken	Version: 2	
Udarb.: Ken	Godk. af: Ken	Dato: 05-10-2015

Struktur	Proces	Resultater
Klinikassistent	Autorefaktion og tonometri samt refraktioneret synstest Herefter dilatation med ogc mydriacyl 5mg/ml efterfulgt af autoperimetri samt fundusfotografering af synsnerven og OCT	Sikre regelmæssig kontrol og dokumentation af: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Øjentryk</li> <li>- Synsfelter</li> <li>- Synsnerver</li> </ul>
Øjenlæge	Spaltelampeundersøgelse inklusive vurdering af kammervinkel samt gonioskopi efterfulgt af information om tilstanden.  Efterfølgende information om at: 1.Sygdommen indebærer en risiko for udvikling af kikkertsyn samt socialt blindhed 2. Behandlingen er medicinsk, og eventuelt laserbehandling eller operation 3. Behandlingen er livslang 4. Behandlingseffekt skal følges af øjenlæge med som minimum måling af trykket på øjet og sysfeltsundersøgel.  Forny recepter på øjendråber	Udvikling af glaukomet påvirkning af synsfunktionen  Patienten tager ansvar for sin egen sygdom ved bevidstheden om lidelsens alvor.  Ny tid efter 3 til 6 måneder alt efter om sygdomstilstanden er stabil