

Procedure

1 Undersøgelse af børn 0-12 år med skelen eller brillekorrigeret nedsat syn eller > 2 linjers forskel i synsstyrke mellem øjnene, samt skeleopereret børn. Børnene undersøges med Snellens ækvivalente optotyper

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
Instruktioner		Side: 1 af 1
Undersøgelse af børn under 12 år med skelen		Dok. nr.: I-030
Målgruppe: Alle		Version: 2
Udarb.: Ken	Godk. af: Ken	Dato: 05-10-2015

Struktur	Proces	Resultater
Klinikassistent	Ved ankomst udføres hvis det er muligt: autorefraktion intraokulært øjentryk og synsstyrke med den målte refraktion	Umiddelbart indtryk af syn og hvilerefraktion
Øjenlæge	Læge undersøger barnet og samtaler med barn og forældre.	Især ved undersøgelse første gang. Løjer stemning før dryp.*
Klinikassistent	Efterfølgende dilatation med ocg Cyclogyl 1% 1 dråbe i begge øjne. Efter 5 minutter gentages denne drypning. Efter 25 minutter foretages autorefraktion efterfulgt af	Objektiv refaktionsbestemmelse Og evt brillerecept
Øjenlæge	undersøgelse af øjenbaggrunden med 90D linsen eller undersøgelse med oftalmoskop	Udelukkelse af sygdomme i øjnene
Ortoptist Lægen afgør tidspunktet for evt. undersøgelse hos ortoptist	Ortoptisk status, syn, undersøges for skelen, samsyn brillejustering om nødvendigt . <i>Der er af klinikansvarlig læge givet generel tilladelse til at ortoptisten kan anvende ocg cyclogyl 1% i forbindelse med undersøgelse og refraktionering</i>	
*OBS: i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at genindkalde hurtigt til færdigundersøgelse efter drypning af øjnene.	Drypning ved første undersøgelse kan i visse tilfælde opleves voldsomt hos enkelte børn	Man opnår en optimal undersøgelse hos barnet og undgår en overgrebslignende situation