

Patientinformation	Opdateret 05.10.15	Doc. P-001.02	Af Kirsten Ninn-Pedersen	Ansvar Kirsten Ninn-Pedersen
--------------------	--------------------	---------------	--------------------------	------------------------------

## AMBULANT OPERATION I FULD BEDØVELSE.

NAVN: \_\_\_\_\_

OPERATIONSDAG: \_\_\_\_\_ dag den \_\_\_\_\_

Kl. \_\_\_\_\_ : Herefter må dit barn **intet** spise eller drikke, skal altså være fastende.

Kl. \_\_\_\_\_ : Gives \_\_\_\_\_ mg diazepam (f.eks. Stesolid) i endetarmen. Hele indholdet i sprøjten skal gives. Lad dit barn blive liggende nogle minutter efter, præparatet er givet. Bemærk, at dit barn kan blive tumlende - "fuld" - hurtigt efter, at medicinen er givet; du skal derfor holde øje med dit barn, så det ikke falder og slår sig.

Kl. \_\_\_\_\_ : Mødetidspunkt i klinikken (= operationstidspunkt).

Det er **meget** vigtigt, at dit barn ved fremmødet er fastende. Dette kan du sikre dig ved at følge denne vejledning og ved især at overholde ovenstående tidspunkter.

Dagen før operationen må dit barn spise og drikke fuldstændigt som normalt.

På operationsdagen må dit barn inden operationen **intet** drikke eller spise (heller ikke bruge tyggegummi). For at kontrollere at dit barn ikke spiser eller drikker, skal det holdes hjemme på operationsdagen. For at undgå at dit barn drikker, bør det ikke børste tænder eller komme i bad om morgenen. Vær også opmærksom på, at dit barn ikke selv står op om natten eller tidligt om morgenen, før du selv er vågen, og på den måde "snyder" sig til at drikke eller spise.

Opholdet i klinikken forventes at vare knapt 45 minutter i alt - fra I kommer og til I kan forlade klinikken igen.

Efter operationen kan dit barn, når I er hjemme igen, atter få noget at drikke og spise, blot lidt ad gangen i begyndelsen, da der ellers let kan komme opkastninger.

Hjemtransporten **skal** foregå i bil, og der **skal** være en voksen ledsager **foruden** chaufføren. Tag evt en taxa. Da der kan forekomme opkastning efter operationen, tilrådes det at medbringe en plastikpose og et håndklæde.

Bedøvelsen er du velkommen til at tale med dit barn om: Dit barn skal trække vejret i en klar plastikmaske, der anbringes over næse og mund (skal "puste ballon"). Der kan ikke bruges sut, når masken anvendes. Dit barn bliver ikke stukket. Søvnens indfinder sig i løbet af 2 minutter, og dit barn vågner først, når operationen er helt overstået. Mindst en af jer forældre vil hele tiden være tilstede hos jeres barn, både indtil det sover, og fra det øjeblik jeres barn atter er vågent. Under opvågningen vil du kunne opleve, at dit barn er meget uroligt og ofte grædende, men det er helt normale reaktioner.

Tobaksrygning er strengt forbudt i alle kliniklokaler af hensyn til dit barn.

Problemer eller tvivlsspørgsmål: Efter operationen kontaktes skadestuen uden for dagarbejdstiden.